



Klimaentwicklung

Arendsee (Altmark)



© Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

+2.6 °C

Temperatursteigerung
bis 2050

Klimainformationen


Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

Klimawandel in Ihrer Region

- Ab 2043 ist ein Jahr wie 2018 Durchschnitt
- Starke Zunahme von Heißen Tagen/
sommerlicher Hitze
- Dauerfrost wird immer weniger wahrscheinlich
Kälteperioden werden abnehmen

Wichtige Maßnahmen

- Erstellung eines Hitzeaktionsplanes
- Anpassung der Bauleitplanung und des
Gebäudebestandes an Hitze
- Aber der Winterdienst bleibt weiterhin notwendig
- Schutz der älteren Menschen und kleinen Kinder vor Hitze





Klimawandel in Ihrer Region

Die Auswirkungen des globalen Klimawandels aufgrund steigender Treibhausgaskonzentrationen zeigen sich auch regional und lokal. Die für Sachsen-Anhalt relevanten Auswirkungen sind steigende Temperaturen, ein verändertes Niederschlagsverhalten und damit einhergehend häufigere und stärkere Wetterextreme wie Starkregen, Hitzewellen und Trockenheit. Zwischen den einzelnen Regionen gibt es jedoch erkennbare Unterschiede. Um Anpassungsmöglichkeiten an den Klimawandel zu entwickeln, sind zuverlässige Klimainformationen auf Grundlage von Beobachtungs- und Klimamolldaten nötig. Das Faktenblatt stellt Analysen bisher beobachteter sowie zukünftig zu erwartender Klimaänderungen bis zum Ende des 21. Jahrhunderts für Ihre Gemeinde zur Verfügung.

Vergangenheit & Gegenwart

Beobachtungsdaten

Das Messnetz des Deutschen Wetterdienstes liefert die Beobachtungsdaten (1) von Temperatur, Niederschlag sowie weiterer Klimakenngrößen zur Analyse des aktuellen und vergangenen Klimas. Dafür werden die Mittelwerte der Klimakenngrößen und -indizes für 30-jährige Zeiträume miteinander verglichen. Da Änderungen einer Klimagröße aussagekräftiger als absolute Werte sind, werden die Ergebnisse als Abweichung zur Klimareferenzperiode angegeben. Als Klimareferenzperiode gilt der von der Weltorganisation für Meteorologie definierte Zeitraum 1961–1990 (2). Zur besseren Vorstellung der Größenordnung der Klimaänderung werden auf dem Faktenblatt den Modellergebnissen Beobachtungsdaten von prägnanten Einzeljahren gegenübergestellt (3). Das über 11 Jahre gleitende Mittel (4) glättet die jährlichen Schwankungen, um den Trend der zeitlichen Entwicklung zu verdeutlichen.

Zukunft

Klimaprojektionen

Klimamodelle sind komplexe Computerprogramme, die für unterschiedliche Szenarien zum Bevölkerungswachstum, zu sozio-ökonomischen und weiteren gesellschaftlichen Entwicklungen Klimaprojektionen bis zum Ende des 21. Jahrhunderts berechnen. Um Unsicherheiten bei der Modellierung zu berücksichtigen, werden verschiedene Modelle zur Berechnung des zukünftigen Klimas verwendet. Das Ergebnis ist ein Ensemble von Klimamodellen, deren Projektionen eine Bandbreite (5) an möglichen Klimaentwicklungen für jedes Szenario aufspannen. Das hier verwendete Mitteldeutsche Kernensemble (MDK) besteht aus 7 Klimamodellen, deren Projektionen auf der Grundlage des Szenarios RCP8.5 (ohne globalen Klimaschutz) zeigen, wie sich unser Klima bei weiterhin ungebremsten Treibhausgasemissionen für die Zeiträume 2021–2050 und 2071–2100 speziell in Mitteldeutschland entwickeln könnte.





Kurze Fakten

• Beobachtung

Jahresmitteltemperatur 1961 bis 1990: 8.4 °C
Veränderungen im Zeitraum 1991 bis 2020:
Zunahme der Jahresdurchschnittstemperatur

• Projektionen


Zunahme der Jahresdurchschnittstemperatur
stärkste projizierte Temperaturveränderung:
+5.1 °C im Sommer
geringste projizierte Temperaturveränderung:
+3.6 °C im Winter

Herausforderung

- starke Zunahme der Sommertemperatur
- Berücksichtigung bei der Stadtplanung notwendig, z. B. Beschattung, Ausrichtung von Gebäuden, Klimatisierung öffentlicher Einrichtungen
- neue Krankheitsüberträger und Erreger
- erhöhtes Schädlingsaufkommen
- aber weiterhin auch kalte Winter möglich

Temperaturentwicklung

Abweichung vom Jahresmittel: 1961 – 1990 in °C



| | Jahr | Frühling | Sommer | Herbst | Winter |
|--------------------------|------|----------|--------|--------|--------|
| Beobachtung in °C | | | | | |
| 1961–1990 | 8.4 | 7.9 | 16.8 | 9.1 | 0.3 |
| Abweichung in °C | | | | | |
| 1991–2020 | +1.1 | +1.3 | +0.9 | +0.5 | +1.7 |
| 2021–2050 | +1.7 | +1.8 | +2.2 | +1.9 | +1 |
| 2071–2100 | +4.2 | +3.7 | +5.1 | +4.4 | +3.6 |
| 1987 (Kältestes Jahr*) | -1.2 | -1.7 | -1.4 | +0.5 | -2.2 |
| 2018 (Wärmstes Jahr*) | +2.2 | +2.5 | +3.1 | +1.4 | +2 |



Kurze Fakten

- **Sommertag:**
mehr als 25 °C Tagesmaximumtemperatur
- **Herausforderungen:**
erhöhte Belastung für den Kreislauf
- **Maßnahmen:**
Verschatten, kühle Orte ausweisen,
Trinkwasserspender, angepasstes Bauen,
Klimatisierung von Gebäuden

Beobachtung in Tagen


| | |
|-----------|-----------|
| 1961–1990 | 28 |
|-----------|-----------|

Abweichung in Tagen

| | |
|------------------------|------------|
| 1991–2020 | +12 |
| 2021–2050 | +25 |
| 2071–2100 | +59 |
| 1962 (Kältestes Jahr*) | -19 |
| 2018 (Wärmstes Jahr*) | +58 |


Sommertage

Abweichung vom Jahresmittel: 1961 – 1990 in Tagen




Anzahl der Sommertage

1990 – 2020 vs 1961–1990




2011–2020 vs 1961–1990



< Abnahme

Zunahme >





Kurze Fakten

- **Heißer Tag*:**
mehr als 30 °C Tagesmaximumtemperatur
- **Herausforderungen:**
starke Belastung für den Kreislauf
erhöhte Anforderungen an Infrastruktur
- **Maßnahmen:**
verschatten, kühle Orte ausweisen,
Hitzewarnsysteme einrichten, öffentliche
Trinkwasserspender, angepasstes Bauen,
Klimatisierung von Altenheimen und Schulen

Beobachtung in Tagen


| | |
|-----------|---|
| 1961–1990 | 4 |
|-----------|---|

Abweichung in Tagen

| | |
|-------------------------|-----|
| 1991–2020 | +5 |
| 2021–2050 | +9 |
| 2071–2100 | +33 |
| 1993 (Kältestes Jahr**) | -4 |
| 2018 (Wärmstes Jahr**) | +24 |


Heiße Tage

Abweichung vom Jahresmittel: 1961 – 1990 in Tagen




Anzahl der Heißen Tage

1990 – 2020 vs 1961–1990



2011–2020 vs 1961–1990



< Abnahme

Zunahme >





Kurze Fakten

- **Frosttag:**
weniger als 0 °C Tagesminimumtemperatur
- **Herausforderungen:**
keine Schneesicherheit
Bevölkerungsschutz (dünne Eisdecken)
zusätzliche Grünschnittpflege durch
Verlängerung der Vegetationsperiode
- **Maßnahmen:**
Winterdienste aufrecht erhalten

Beobachtung in Tagen

| | |
|-----------|-----------|
| 1961–1990 | 94 |
|-----------|-----------|

Abweichung in Tagen

| | |
|-----------|------------|
| 1991–2020 | -14 |
|-----------|------------|

| | |
|-----------|------------|
| 2021–2050 | -29 |
|-----------|------------|


| | |
|-----------|------------|
| 2071–2100 | -61 |
|-----------|------------|

| | |
|-----------------------|------------|
| 2000 (Wärmstes Jahr*) | -44 |
|-----------------------|------------|

| | |
|------------------------|------------|
| 1996 (Kältestes Jahr*) | +36 |
|------------------------|------------|


Frosttage

Abweichung vom Jahresmittel: 1961 – 1990 in Tagen




Anzahl der Frosttage

1990 – 2020 vs 1961–1990




2011–2020 vs 1961–1990



< Abnahme

Zunahme >





Kurze Fakten

- **Eistag*:**
weniger als 0 °C Tagesmaximumtemperatur
- **Herausforderungen:**
keine Schneesicherheit
Bevölkerungsschutz (dünne Eisdecken)
zusätzliche Grünschnittpflege durch
Verlängerung der Vegetationsperiode
- **Maßnahmen:**
Winterdienste aufrecht erhalten

Beobachtung in Tagen

| | |
|-----------|-----------|
| 1961–1990 | 22 |
|-----------|-----------|

Abweichung in Tagen

| | |
|-----------|-----------|
| 1991–2020 | -6 |
|-----------|-----------|

| | |
|-----------|------------|
| 2021–2050 | -13 |
|-----------|------------|


| | |
|-----------|------------|
| 2071–2100 | -23 |
|-----------|------------|

| | |
|------------------------|------------|
| 1974 (Wärmstes Jahr**) | -21 |
|------------------------|------------|

| | |
|-------------------------|------------|
| 1963 (Kältestes Jahr**) | +43 |
|-------------------------|------------|


Eistage

Abweichung vom Jahresmittel: 1961 – 1990 in Tagen




Anzahl der Eistage

1990 – 2020 vs 1961–1990




2011–2020 vs 1961–1990



< Abnahme

Zunahme >





Kurze Fakten


- Jahresniederschlag 1961 bis 1990: 603 mm
- Veränderungen im Zeitraum 1991 bis 2020: kaum Veränderung des Jahresniederschlags
- Projektionen: kaum Veränderung des Jahresniederschlags
- stärkste projizierte Niederschlagsänderung: +22 % im Winter
- geringste projizierte Niederschlagsänderung: +17 % im Frühling

Herausforderung

- mittel- und langfristig ist mit einer geringen Änderung des mittleren Jahresniederschlags zu rechnen, allerdings zeigen die Modelle eine Abnahme der Sommer- und Zunahme der Winterniederschläge
- Folge: längere Trockenphase unterbrochen von einzelnen (Stark-)Regenereignissen
- verstärkte Erosion trockener Böden
- mehr Sedimenteintrag in das Kanalnetz

Niederschlagsentwicklung

Abweichung vom Jahresmittel: 1961 – 1990 in %



| | Jahr | Frühling | Sommer | Herbst | Winter |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Beobachtung in mm | | | | | |
| 1961–1990 | 603 | 146 | 183 | 128 | 146 |
| Abweichung in % | | | | | |
| 1991–2020 | +2 | -14 | +2 | +15 | +5 |
| 2021–2050 | +5 | +11 | -4 | +2 | +11 |
| 2071–2100 | +6 | +17 | -17 | +7 | +22 |
| 2018 (regenärmstes Jahr*) | -37 | -13 | -66 | -61 | -4 |
| 2007 (regenreichstes Jahr*) | +45 | +36 | +67 | +34 | +35 |



Kurze Fakten

- **Regentag:**
Tagesniederschlagssumme > 1mm
- **Herausforderungen:**
Verringerte Wasserverfügbarkeit
- **Maßnahmen:**
Regenwassernutzung ermöglichen bzw. optimieren
Bewässerung von Stadtgrün

Beobachtung in Tagen


| | |
|-----------|------------|
| 1961–1990 | 120 |
|-----------|------------|

Abweichung in Tagen

| | |
|-----------------------------|------------|
| 1991–2020 | 0 |
| 2021–2050 | -3 |
| 2071–2100 | -9 |
| 2018 (regenärmstes Jahr*) | -40 |
| 1998 (regenreichstes Jahr*) | +28 |


Regentage

Abweichung vom Jahresmittel: 1961 – 1990 in Tagen




Anzahl der Regentage

1990 – 2020 vs 1961–1990




2011–2020 vs 1961–1990



< Abnahme

Zunahme >





Kurze Fakten

- **Starkregentag:**
Tagesniederschlagssumme größer als das 90er Perzentil (oberste 10%) 1961 bis 1990
- **Herausforderungen:**
Schäden durch Erosion o. Überschwemmung
- **Maßnahmen:**
Möglichkeiten zum Regenwasserrückhalt in der Fläche schaffen, z. B. durch Rigolen
Kanalisation anpassen
technischen Hochwasserschutz ggf. ausbauen

Beobachtung in Tagen

1961–1990 **36**

Abweichung in Tagen

1991–2020 **+3**

2021–2050 **+2**


2071–2100 **+3**

2018 (geringste Anzahl*) **-14**

2007 (höchste Anzahl*) **+28**


Starkregentage

Abweichung vom Jahresmittel: 1961 – 1990 in Tagen





Anzahl der Tage mit Starkregen

1990 – 2020 vs 1961–1990



2011–2020 vs 1961–1990





Das Landesamt für Umweltschutz ist die Fachbehörde zum Umweltschutz in Sachsen-Anhalt. Dafür erfassen und bewerten die Mitarbeiter den Zustand der Umwelt, leiten daraus Entscheidungsgrundlagen, Konzepte und Maßnahmen ab und sorgen für deren Umsetzung.

Mehr Informationen unter:

<https://lau.sachsen-anhalt.de>

Im Dezernat Klima, Erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit, Umweltallianz werden sowohl die Belange des Klimaschutzes als auch der Anpassung an die Folgen des Klimawandels betrachtet. Eine der zentralen Aufgaben ist es, Informationen sowohl für politische Entscheidungsträger in Sachsen-Anhalt als auch für die breite Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Mehr Informationen unter:

<https://lau.sachsen-anhalt.de>

Angebote für Kommunen

- Klimaanalyse: Auswertungen zu den Veränderungen des Klimas der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für Ihre Region
- Erstellung von vierteljährlichen Witterungsberichten für Sachsen-Anhalt
- Bereitstellung von Klimadaten für bspw. Wirkmodellierungen sowie Unterstützung beim Lösen Ihrer spezifischen Aufgabenstellungen
- Klimamonitoring: Aufbau, Weiterentwicklung und jährliche Fortschreibung der Klimawandel-Indikatoren des Landes Sachsen-Anhalt als wichtige kommunale Bewertung- und Entscheidungshilfe
- Identifikation von Klimawandelfolgen für einzelne Handlungsfelder wie z.B. Landwirtschaft, Wasserwirtschaft und Naturschutz
- Information und Beratung zu möglichen Anpassungsmaßnahmen und Fördermöglichkeiten

Ihre Ansprechpartner

Länderredakteur Sachsen-Anhalt

Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

Stefan Struve

Telefon: 0345/5704-343

E-Mail: Stefan.struve@lau.mlu.sachsen-anhalt.de

Haftungsausschluss

Die Inhalte des Informationssystems ReKIS werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und fortgeführt. Die Auftraggeber, Entwickler und Betreiber übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereit gestellten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte der Website erfolgt auf eigene Verantwortung.

Quelle Bild Cover

© Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt