



# Klimasteckbrief

## Oebisfelde–Weferlingen



© Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

# +2.6 °C

Temperatursteigerung  
im Jahr 2050

## Klimainformationen


Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

## Klimawandel in Ihrer Region

- In 10 Jahren sind die derzeit heißesten Jahre nur noch durchschnittlich
- Starke Zunahme von Heißen Tagen/ sommerlicher Hitze
- Dauerfrost wird immer weniger wahrscheinlich  
Kälteperioden werden abnehmen
- Der Jahresniederschlag ändert sich in der Zukunft nur geringfügig
- Allerdings gibt es Veränderungen innerhalb der Jahreszeiten
- Im Sommer nimmt der Niederschlag ab und im Winter zu

## Wichtige Maßnahmen

- Erstellung eines Hitzeaktionsplanes
- Anpassung der Bauleitplanung und des Gebäudebestandes an Hitze
- Der Winterdienst bleibt weiterhin notwendig
- Schutz der älteren Menschen und kleinen Kinder vor Hitze
- Anpassung der Bauleitplanung an Wechsel von Starkregen und Trockenheit
- Kanalisation entsprechend dimensionieren
- Wasserrückhalt in der Fläche erhöhen
- Böden entsiegeln





## Klimawandel in Ihrer Region

Die Auswirkungen des globalen Klimawandels aufgrund steigender Treibhausgaskonzentrationen zeigen sich auch regional und lokal. Die für Sachsen-Anhalt relevanten Auswirkungen sind steigende Temperaturen, ein verändertes Niederschlagsverhalten und damit einhergehend häufigere und stärkere Wetterextreme wie Starkregen, Hitzewellen und Trockenheit. Zwischen den einzelnen Regionen gibt es jedoch erkennbare Unterschiede. Um Anpassungsmöglichkeiten an den Klimawandel zu entwickeln, sind zuverlässige Klimainformationen auf Grundlage von Beobachtungs- und Klimamodelldaten nötig. Das Faktenblatt stellt Analysen bisher beobachteter sowie zukünftig zu erwartender Klimaänderungen bis zum Ende des 21. Jahrhunderts für Ihre Gemeinde zur Verfügung.

### Vergangenheit & Gegenwart


#### Beobachtungsdaten

Das Messnetz des Deutschen Wetterdienstes liefert die Beobachtungsdaten (1) von Temperatur, Niederschlag sowie weiterer Klimakenngrößen zur Analyse des aktuellen und vergangenen Klimas. Dafür werden 30-Jahres-Mittelwerte unterschiedlicher Zeiträume verglichen. Üblich ist der Vergleich mit den durchschnittlichen Bedingungen des Zeitraums 1961–1990 (2). Weltweit kann man so aussagekräftige Informationen über die Veränderung des Klimas ableiten. Zur besseren Vorstellung der Größenordnung der Klimaänderung werden prägnante Einzeljahre gegenübergestellt (3). Das über 11 Jahre gleitende Mittel (4) glättet die jährlichen Schwankungen, um den Trend der zeitlichen Entwicklung zu verdeutlichen.

### Zukunft

#### Klimaprojektionen

Klimamodelle sind komplexe Computerprogramme, die für unterschiedliche Szenarien zum Bevölkerungswachstum, zu sozio-ökonomischen und weiteren gesellschaftlichen Entwicklungen Klimaprojektionen bis zum Ende des 21. Jahrhunderts berechnen. Um Unsicherheiten bei der Modellierung zu berücksichtigen, werden verschiedene Modelle zur Berechnung des zukünftigen Klimas verwendet. Das Ergebnis ist ein Ensemble von Klimamodellen, deren Projektionen eine Bandbreite (5) an möglichen Klimaentwicklungen für jedes Szenario aufspannen. Das hier verwendete Mitteldeutsche Kernensemble\* (MDK) besteht aus 7 Klimamodellen, deren Projektionen auf der Grundlage des Szenarios RCP8.5 (ohne globalen Klimaschutz) zeigen, wie sich unser Klima bei weiterhin ungebremsten Treibhausgasemissionen für die Zeiträume 2021–2050 und 2071–2100 speziell in Mitteldeutschland entwickeln könnte.





# Temperaturentwicklung

Oebisfelde-Weferlingen

## Kurze Fakten

### • Beobachtung

Jahresmitteltemperatur 1961 bis 1990: 8.8 °C  
Veränderungen im Zeitraum 1991 bis 2020:

Zunahme der Jahresdurchschnittstemperatur

### • Projektionen (2071 bis 2100)

Zunahme der Jahresdurchschnittstemperatur  
stärkste projizierte Temperaturveränderung:

+5.1 °C im Sommer

geringste projizierte Temperaturveränderung:


+3.7 °C im Frühling

## Herausforderung

- starke Zunahme der Sommertemperatur
- Berücksichtigung bei der Stadtplanung notwendig, z. B. Beschattung, Ausrichtung von Gebäuden, Klimatisierung öffentlicher Einrichtungen
- neue Krankheitsüberträger und Erreger
- erhöhtes Schädlingsaufkommen
- aber weiterhin auch kalte Winter möglich

## Temperaturentwicklung\*\*

Abweichung vom Jahresmittel: 1961 – 1990 in °C



|                            | Jahr | Frühling | Sommer | Herbst | Winter |
|----------------------------|------|----------|--------|--------|--------|
| <b>Beobachtung in °C**</b> |      |          |        |        |        |
| 1961–1990                  | 8.8  | 8.2      | 17     | 9.3    | 0.4    |
| <b>Abweichung in °C**</b>  |      |          |        |        |        |
| 1991–2020                  | +1   | +1.2     | +1     | +0.5   | +1.4   |
| 2021–2050                  | +1.9 | +1.8     | +2.1   | +1.8   | +2.1   |
| 2071–2100                  | +4.4 | +3.7     | +5.1   | +4.4   | +4.7   |
| 1996 (Kältestes Jahr*)     | –1.4 | –0.9     | –0.2   | –0.7   | –3.5   |
| 2018 (Wärmstes Jahr*)      | +2   | +2.3     | +2.8   | +1.3   | +2.1   |

**ReKIS**

Regionales Klimainformationssystem  
für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

\* Bezugszeitraum 1961 bis 2020

\*\* Flächenmittel



- **Sommertag:**  
mehr als 25 °C Tagesmaximumtemperatur
- **Herausforderungen:**  
erhöhte Belastung für den Kreislauf
- **Maßnahmen:**  
Verschatten, kühle Orte ausweisen,  
Trinkwasserspender, angepasstes Bauen,  
Klimatisierung von Gebäuden

## Beobachtung in Tagen

|           |    |
|-----------|----|
| 1961–1990 | 26 |
|-----------|----|

## Abweichung in Tagen

|           |     |
|-----------|-----|
| 1991–2020 | +16 |
|-----------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| 2021–2050 | +27 |
|-----------|-----|


|           |     |
|-----------|-----|
| 2071–2100 | +64 |
|-----------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 1962 (Kältestes Jahr*) | –16 |
|------------------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 2018 (Wärmstes Jahr*) | +59 |
|-----------------------|-----|


## Sommertage\*\*

Abweichung vom Jahresmittel: 1961 – 1990 in Tagen




## Anzahl der Sommertage

1991 – 2020 vs 1961–1990



2021–2050 vs 1961–1990



ReKIS

Regionales Klimainformationssystem  
für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

\* Bezugszeitraum 1961 bis 2020

\*\* Flächenmittel

Datengrundlage: Deutscher Wetterdienst

Verarbeitung: TU Dresden

Geobasisdaten © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, 2025 / 010312

Leaflet | © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA

Geofachdaten: © Landesamt für Umweltschutz  
Sachsen-Anhalt (LAU), 2025





# Heiße Tage

Oebisfelde-Weferlingen

- **Heißer Tag\*:**  
mehr als 30 °C Tagesmaximumtemperatur  
jeder Heiße Tag auch ein Sommertag
- **Herausforderungen:**  
starke Belastung für den Kreislauf  
erhöhte Anforderungen an Infrastruktur
- **Maßnahmen:**  
verschatten, kühle Orte ausweisen,  
Hitzewarnsysteme einrichten, öffentliche  
Trinkwasserspender, angepasstes Bauen,  
Klimatisierung von Altenheimen und Schulen

## Beobachtung in Tagen

|           |   |
|-----------|---|
| 1961–1990 | 4 |
|-----------|---|

## Abweichung in Tagen

|           |    |
|-----------|----|
| 1991–2020 | +6 |
|-----------|----|

|           |     |
|-----------|-----|
| 2021–2050 | +11 |
|-----------|-----|


|           |     |
|-----------|-----|
| 2071–2100 | +37 |
|-----------|-----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| 1993 (Kältestes Jahr*) | -4 |
|------------------------|----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 2018 (Wärmstes Jahr*) | +22 |
|-----------------------|-----|


## Heiße Tage\*\*

Abweichung vom Jahresmittel: 1961 – 1990 in Tagen




## Anzahl der Heißen Tage

1991 – 2020 vs 1961–1990



2021–2050 vs 1961–1990



< Abnahme

Zunahme >

-6 -3 0 3 6 9 12 15

ReKIS

Regionales Klimainformationssystem  
für Sachsen-Anhalt und Thüringen

\* Bezugszeitraum 1961 bis 2020

\*\* Flächenmittel

Datengrundlage: Deutscher Wetterdienst

Verarbeitung: TU Dresden

Geobasisdaten © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, 2025 / 010312

Leaflet | © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA

Geofachdaten: © Landesamt für Umweltschutz  
Sachsen-Anhalt (LAU), 2025



# Frosttage

Oebisfelde-Weferlingen

- **Frosttag:**  
weniger als 0 °C Tagesminimumtemperatur
- **Herausforderungen:**  
keine Schneesicherheit  
Bevölkerungsschutz (dünne Eisdecken)  
zusätzliche Grünschnittpflege durch  
Verlängerung der Vegetationsperiode
- **Maßnahmen:**  
Winterdienste aufrecht erhalten

## Beobachtung in Tagen

1961–1990

78

## Abweichung in Tagen

1991–2020

–5

2021–2050

–28

2071–2100

–59

1974 (Wärmstes Jahr\*)


–39

1996 (Kältestes Jahr\*)

+44


## Frosttage\*\*

Abweichung vom Jahresmittel: 1961 – 1990 in Tagen




## Anzahl der Frosttage

1991 – 2020 vs 1961–1990




2021–2050 vs 1961–1990



< Abnahme

Zunahme >



ReKIS

Regionales Klimainformationssystem  
für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

\* Bezugszeitraum 1961 bis 2020

\*\* Flächenmittel

Datengrundlage: Deutscher Wetterdienst

Verarbeitung: TU Dresden

Geobasisdaten © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, 2025 / 010312

Leaflet | © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA

Geofachdaten: © Landesamt für Umweltschutz  
Sachsen-Anhalt (LAU), 2025



- **Eistag\*:**  
weniger als 0 °C Tagesmaximumtemperatur  
jeder Eistag auch ein Frosttag
- **Herausforderungen:**  
keine Schneesicherheit  
Bevölkerungsschutz (dünne Eisdecken)  
zusätzliche Grünschnittpflege durch  
Verlängerung der Vegetationsperiode
- **Maßnahmen:**  
Winterdienste aufrecht erhalten

## Beobachtung in Tagen

|           |    |
|-----------|----|
| 1961–1990 | 25 |
|-----------|----|

## Abweichung in Tagen

|           |    |
|-----------|----|
| 1991–2020 | -7 |
|-----------|----|

|           |     |
|-----------|-----|
| 2021–2050 | -12 |
|-----------|-----|


|           |     |
|-----------|-----|
| 2071–2100 | -23 |
|-----------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 1974 (Wärmstes Jahr*) | -25 |
|-----------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 1963 (Kältestes Jahr*) | +44 |
|------------------------|-----|


## Eistage\*\*

Abweichung vom Jahresmittel: 1961 – 1990 in Tagen





## Anzahl der Eistage

1991 – 2020 vs 1961–1990



2021–2050 vs 1961–1990





## Kurze Fakten


- Jahresniederschlag 1961 bis 1990: 616 mm
- Veränderungen im Zeitraum 1991 bis 2020: kaum Veränderung des Jahresniederschlags
- Projektionen (2071 bis 2100): kaum Veränderung des Jahresniederschlags
- stärkste projizierte Niederschlagszunahme: +18 % im Frühling
- stärkste projizierte Niederschlagsabnahme: -17 % im Sommer

## Herausforderung

- mittel- und langfristig ist mit einer geringen Änderung des mittleren Jahresniederschlags zu rechnen, allerdings zeigen die Modelle eine Abnahme der Sommer- und Zunahme der Winterniederschläge
- Folge: längere Trockenphase unterbrochen von einzelnen (Stark-)Regenereignissen
- verstärkte Erosion trockener Böden
- mehr Sedimenteintrag in das Kanalnetz

## Niederschlagsentwicklung\*\*

Abweichung vom Jahresmittel: 1961 – 1990 in %



|                             | Jahr | Frühling | Sommer | Herbst | Winter |
|-----------------------------|------|----------|--------|--------|--------|
| <b>Beobachtung in mm**</b>  |      |          |        |        |        |
| 1961–1990                   | 616  | 151      | 186    | 132    | 147    |
| <b>Abweichung in %**</b>    |      |          |        |        |        |
| 1991–2020                   | +6   | -5       | +8     | +16    | +6     |
| 2021–2050                   | +4   | +11      | -4     | +2     | +10    |
| 2071–2100                   | +4   | +18      | -17    | +2     | +18    |
| 2018 (regenärmstes Jahr*)   | -34  | -7       | -70    | -54    | +1     |
| 2002 (regenreichstes Jahr*) | +49  | +7       | +81    | +65    | +36    |



- **Regentag:**  
Tagesniederschlagssumme > 1mm
- **Herausforderungen:**  
Verringerte Wasserverfügbarkeit
- **Maßnahmen:**  
Regenwassernutzung ermöglichen bzw. optimieren  
Bewässerung von Stadtgrün

#### Beobachtung in Tagen

|           |            |
|-----------|------------|
| 1961–1990 | <b>120</b> |
|-----------|------------|

#### Abweichung in Tagen

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1991–2020                   | <b>+4</b>  |
| 2021–2050                   | <b>–3</b>  |
| 2071–2100                   | <b>–10</b> |
| 2018 (regenärmstes Jahr*)   | <b>–30</b> |
| 1965 (regenreichstes Jahr*) | <b>+35</b> |


## Regentage\*\*

Abweichung vom Jahresmittel: 1961 – 1990 in Tagen




## Anzahl der Regentage

1991 – 2020 vs 1961–1990




2021–2050 vs 1961–1990



< Abnahme

Zunahme >



**ReKIS**

Regionales Klimainformationssystem  
für Sachsen-Anhalt und Thüringen

\* Bezugszeitraum 1961 bis 2020

\*\* Flächenmittel

Datengrundlage: Deutscher Wetterdienst

Verarbeitung: TU Dresden

Geobasisdaten © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, 2025 / 010312

Leaflet | © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA

Geofachdaten: © Landesamt für Umweltschutz  
Sachsen-Anhalt (LAU), 2025






- **Starkregentag:**  
Tagesniederschlagshöhe entspricht den obersten 10% zwischen 1961 und 1990
- **Herausforderungen:**  
Schäden durch Erosion o. Überschwemmung
- **Maßnahmen:**  
Möglichkeiten zum Regenwasserrückhalt in der Fläche schaffen, z. B. durch Rigolen  
Kanalisation anpassen  
technischen Hochwasserschutz ggf. ausbauen

| Beobachtung in Tagen     |     |
|--------------------------|-----|
| 1961–1990                | 36  |
| Abweichung in Tagen      |     |
| 1991–2020                | +4  |
| 2021–2050                | +1  |
| 2071–2100                | +2  |
| 1971 (geringste Anzahl*) | -14 |
| 1961 (höchste Anzahl*)   | +26 |


## Starkregentage\*\*

Abweichung vom Jahresmittel: 1961 – 1990 in Tagen





## Anzahl der Tage mit Starkregen

1991 – 2020 vs 1961–1990



2021–2050 vs 1961–1990





Das Landesamt für Umweltschutz ist die Fachbehörde zum Klimaschutz in Sachsen-Anhalt. Dafür erfassen und bewerten die Mitarbeiter den Zustand der Umwelt, leiten daraus Entscheidungsgrundlagen, Konzepte und Maßnahmen ab und sorgen für deren Umsetzung.

Mehr Informationen unter:

<https://lsnq.de/lau>

Im Dezernat Klima, Erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit, Umweltallianz werden die Belange des Klimawandels betrachtet. Eine der zentralen Aufgaben ist es, Informationen sowohl für politische Entscheidungsträger in Sachsen-Anhalt als auch für die breite Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

Mehr Informationen unter:

<https://lsnq.de/laukeenu>

## Angebote für Kommunen

- Klimaanalyse: Auswertungen zu den Veränderungen des Klimas der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für Ihre Region
- Erstellung von vierteljährlichen Witterungsberichten für Sachsen-Anhalt
- Bereitstellung von Klimadaten für bspw. Wirkmodellierungen sowie Unterstützung beim Lösen Ihrer spezifischen Aufgabenstellungen
- Klimamonitoring: Aufbau, Weiterentwicklung und jährliche Fortschreibung der Klimawandel-Indikatoren des Landes Sachsen-Anhalt als wichtige kommunale Bewertungs- und Entscheidungshilfe
- Identifikation von Klimawandelfolgen für einzelne Handlungsfelder wie z.B. Landwirtschaft, Wasserwirtschaft und Naturschutz
- Information und Beratung zu möglichen Anpassungsmaßnahmen und Fördermöglichkeiten

## Ihre Ansprechpartner

Länderredakteur Sachsen-Anhalt

Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

Stefan Struve

Telefon: 0345/5704-343

E-Mail: [Stefan.struve@lau.mwu.sachsen-anhalt.de](mailto:Stefan.struve@lau.mwu.sachsen-anhalt.de)

## Haftungsausschluss

Die Inhalte des Informationssystems ReKIS werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und fortgeführt. Die Auftraggeber, Entwickler und Betreiber übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereit gestellten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte der Website erfolgt auf eigene Verantwortung.

Quelle Bild Cover

© Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt